

# ENBREL<sup>®</sup> PASSAPORTO DEL PAZIENTE

Importanti informazioni sulla  
sicurezza per il suo trattamento  
con Enbrel<sup>®</sup> (etanercept)

**Enbrel<sup>®</sup>**  
**Etanerceptum**

## INDICE

Di che cosa occorre tener conto prima dell'impiego.....	3
Informi il suo medico sulla terapia con Enbrel®.....	4
Infezioni .....	6
I suoi medicinali .....	8
Protocollo dei numeri di lotto.....	10
Medico curante .....	14
Informazioni sul paziente.....	15

## DI CHE COSA OCCORRE TENER CONTO PRIMA DELL'IMPIEGO

Questo passaporto contiene importanti informazioni sulla sicurezza, di cui deve tenere conto prima e durante il trattamento con Enbrel®. Se ha difficoltà a comprendere queste informazioni, chieda spiegazioni al suo medico.

- Faccia vedere questa scheda a tutti i medici coinvolti nel suo trattamento.
- Ulteriori informazioni si trovano nel foglietto illustrativo di Enbrel®.
- Porti con sé questo passaporto del paziente per ulteriori 2 mesi dopo l'ultima dose di Enbrel®, poiché possono manifestarsi effetti collaterali anche dopo l'ultima dose.

## INFORMI IL SUO MEDICO SULLA TERAPIA CON ENBREL®

- prima di un importante intervento chirurgico (anche odontoiatrico);
- in caso di infezioni, febbre persistente, infiammazione della gola, ematomi, emorragie o pallore; informi anche il suo medico che deve essere eseguito un test per la tubercolosi;
- in caso di reazioni allergiche, p. es. senso di costrizione al petto, respiro sibilante, confusione o eruzione cutanea;
- in presenza di segni di insufficienza cardiaca, come fiato corto durante la notte o sotto sforzo, tosse notturna, gonfiore delle caviglie, sensazione di oppressione nella zona della gola/ dell'addome, colorazione bluastra delle unghie/delle labbra;

- se desidera avere un bambino, è incinta o sta allattando. Si raccomanda di attendere 6 mesi dopo la nascita prima di somministrare vaccini vivi ai neonati esposti a Enbrel® in utero, salvo che i livelli di Enbrel® nel siero del neonato non siano rilevabili o che il beneficio della vaccinazione superi chiaramente il rischio teorico della somministrazione di vaccini vivi al neonato;
- prima di farsi vaccinare e prima di assumere altri medicinali, anche se acquistati di sua iniziativa.

*Avvertenza importante: questo elenco non è esaustivo. Consulti l'informazione destinata ai pazienti e/o chieda consiglio al suo medico, farmacista o infermiere.*

## INFEZIONI

**Enbrel® può aumentare il rischio di contrarre infezioni, che potrebbero anche essere gravi.**

- Se ha un'infezione, non usi Enbrel®. Se ha dei dubbi, si rivolga al suo medico.
- Se sviluppa sintomi che potrebbero indicare un'infezione, come febbre, tosse persistente, perdita di peso o apatia, deve richiedere subito assistenza medica.
- Prima di iniziare la terapia deve sottoporsi a un test per la tubercolosi (TB). Chieda al suo medico di annotare in questa sezione le date e i risultati dei suoi ultimi test per la TB.

Test

Data

Risultato

<hr/>	<hr/>	<hr/>

## I SUOI MEDICAMENTI

**Chieda al suo medico di elencare gli altri medicinali che assume e che potrebbero aumentare il rischio di contrarre infezioni.**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## PROTOCOLLO DEI NUMERI DI LOTTO

**È importante protocollare i numeri di lotto stampati sulla confezione di tutte le dosi di Enbrel® somministrate.**

**lo uso:**

- Siringa preriempita Enbrel®**
- Penna preriempita Enbrel® MYCLIC®**
- Enbrel® liofilizzato**

Data della  
somministrazione

Numero di lotto

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# PROTOCOLLO DEI NUMERI DI LOTTO

Data della  
somministrazione

Numero di lotto

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Data della  
somministrazione

Numero di lotto

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## MEDICO CURANTE

Nome:

---

Indirizzo:

---

---

Numero di telefono:

---

Numero di fax:

---

## INFORMAZIONI SUL PAZIENTE

Nome:

---

Indirizzo:

---

---

Numero di telefono:

---

Data di nascita:

---



**Pfizer AG**  
Schärenmoosstrasse 99  
Postfach  
8052 Zürich

PP-ENB-CHE-0649 Aug 2022